



ГБУЗ НО НОЦОЗМП
ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Алгоритм действий при обнаружении перечисленных симптомов

1. Немедленно вызвать скорую помощь (в разговоре с диспетчером озвучить подозрение на инфаркт миокарда, чтобы на вызов приехала специализированная кардиологическая или реанимационная бригада).

Звони 112 или 03!

2. Обеспечить больному полусидячее положение (возвышенное положение верхней половины туловища снижает преднагрузку на сердце).

3. Постараться успокоить больного

4. Обеспечить приток кислорода (открыть окна, двери).

5. Снять верхнюю одежду и ослабить все сжимающие тело элементы (галстук, ремень).

6. Дать разжевать полтаблетки аспирина (он снижает процесс тромбообразования).


7. При возможности измерить АД и посчитать пульс до приезда скорой помощи.



- боль или чувство сжатия, давления или тяжести за грудиной, которые иногда описываются пациентом как дискомфорт
- возможны иррадиация в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, эпигастрий



- клинические проявления, такие как потливость, тошнота, боль в животе, одышка, удушье, потеря сознания



Признаки инфаркта

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ?

- симптомы, как правило, возникают в покое, не устраняются приемом нитроглицерина
- симптомы могут носить волнообразный характер и продолжаться от 20 мин до нескольких часов.



До приезда скорой помощи запрещено принимать ненаркотические анальгетики!

