



# РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТУ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 СПУТНИКОМ V

(Г а м - К О В И Д - В а к)

**ВАШЕ КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ - НАША ЦЕЛЬ!** А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАТЬ НАШ ПОТЕНЦИАЛ В ДОСТИЖЕНИИ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ, МЫ ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19.

В ТЕЧЕНИЕ **30 МИНУТ** ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОСТАВАЙТЕСЬ В МЕДИЦИНСКИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.




30 мин



ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ (И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ I КОМПОНЕНТА И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ II КОМПОНЕНТА) В ПЕРВЫЕ-ВТОРЫЕ СУТКИ **МОГУТ РАЗВИВАТЬСЯ И РАЗРЕШАЮТСЯ** В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДНЕЙ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ **ОБЩИЕ** (ОЗНОБ, ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, БОЛЬ В СУСТАВАХ И МЫШЦАХ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, СЛАБОСТЬ) **И МЕСТНЫЕ** (БОЛЕЗНЕННОСТЬ В МЕСТЕ ИНЪЕКЦИИ, ПОКРАСНЕНИЕ, ОТЁЧНОСТЬ) **РЕАКЦИИ**. РЕЖЕ ОТМЕЧАЮТСЯ ТОШНОТА, ДИСПЕПСИЯ, СНИЖЕНИЕ АППЕТИТА, ИНОГДА - УВЕЛИЧЕНИЕ РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФУЗЛОВ. ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.



РЕКОМЕНДУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ НЕ МОЧИТЬ МЕСТО ИНЪЕКЦИИ, НЕ ПОСЕЩАТЬ САУНУ, БАНЮ, НЕ ПРИНИМАТЬ АЛКОГОЛЬ, ИЗБЕГАТЬ ЧРЕЗМЕРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК.



ПРИ ПОКРАСНЕНИИ, ОТЁЧНОСТИ, БОЛЕЗНЕННОСТИ МЕСТА ВАКЦИНАЦИИ ПРИНЯТЬ АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ - НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.



**ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19 НЕ ОТМЕНЯЕТ ДЛЯ ПРИВИТОГО ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМОСТЬ НОСИТЬ МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ.**