




РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ



→ Ротавирусная инфекция – одна из ведущих причин заболеваний, сопровождающихся диареей, а иногда и рвотой, лихорадкой и недомоганием, у детей до 5 лет.

ТИПИЧНЫЕ СИМПТОМЫ:



повышение температуры




рвота



водянистая диарея

Ротавирус А, на долю которого приходится более 90 % случаев ротавирусной инфекции, широко распространён во всём мире. Ежегодно регистрируется до 25 млн случаев заболевания, из них 600–900 тысяч – с летальным исходом, особенно это касается людей с ослабленным здоровьем.

Ротавирус передаётся водным, контактно-бытовым, пищевым путём.



! ПЛАНОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ РОТАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

Рекомендована вакцинация детей от 8 недели жизни до 2-х лет, периода, когда инфекция наиболее опасна тяжелыми последствиями.

В РФ зарегистрирована единственная вакцина против ротавирусной инфекции — РотаТек.

Многие страны мира ввели эту прививку в график обязательных, у нас в стране она пока делается по желанию.

